

# **VERTISSEMENTS GRICOLES**

## EDITION GRANDES CULTURES



STATION  
POITOU-CHARENTES

000161  
S.R.P.V.

13, ROUTE DE LA FORET

Bulletin n° 290 (10/95) 03/05/1995

86580 BIARD

BLE : Attention aux maladies ; adaptez votre stratégie fongicide

### COLZA : Stade G3 à G4

#### MALADIES

##### Situation

Les traitements ont dû être réalisés. Le pseudo a été maintenu sur les étages foliaires inférieurs. L'alternaria est pratiquement absent.

##### Préconisation

Il est trop tard pour intervenir ; vous êtes trop en curatif pour espérer une bonne efficacité sur sclérotinia.

#### INSECTES

##### Situation

Profitez du beau temps pour faire le point au niveau charançons des siliques, si vous n'êtes pas encore en G4.

##### Préconisation

Intervenir si vous observez 10 charançons pour 50 plantes. Plus de traitement à partir de G4.

**POIS : Stade 6 feuilles à 10 feuilles , fin des traitements sitones.**

**BLE : Stade ligule de la dernière feuille visible à début épiaison.**

#### MALADIES FOLIAIRES

##### Situation

**Septoriose** : Elle est présente sur F3 avec une fréquence encore faible mais des

contaminations ont eu lieu suite aux dernières pluies. Le risque est le plus élevé pour les parcelles levées avant le 10 novembre, notamment sur la façade atlantique.

**Rouille brune** : Elle poursuit sa progression surtout sur la façade atlantique ; le retour de températures plus élevées favorise son évolution.

##### Préconisation

\* Parcelles où un traitement a été effectué il y a plus de trois semaines :

- Pour les parcelles levées avant le 10 novembre en Charente-Maritime et Charente, intervenir rapidement.

- Dans les autres situations, intervenir dans un délai d'une semaine environ (stade fin gonflement). Choisir une triazole suffisamment rémanente pour permettre une bonne protection jusqu'en fin de cycle.

\* Parcelles à bon potentiel protégées depuis moins de 3 semaines : prévoir le renouvellement de la protection 20 jours environ après le premier passage.

\* Parcelles n'ayant reçu aucune protection fongicide : intervenir rapidement avec une triazole haut de gamme.

**ORGE D'HIVER : Stade sortie des barbes à épiaison**

Intervenir rapidement dans les parcelles où le traitement n'a pas été renouvelé.

**ORGE DE PRINTEMPS : Surveiller les pucerons sur les semis tardifs en sud Charentes.**

Δ34° J 40830



714